

30-50%.

10 / 30-500

5-15% (Marrazzi, Lorente de No, 1944). « » ( , 1973)

1,5-3

50-100 / . 0,2-1% 3-5 , -

( ). - +

(Meves,1960, 1974, 1995, 2003).

( 100 ) , -

( 2 )

4-5 0,3-0,5 , (N 05-04-48883)

al., 1940). 3-5 - « » (Pumphrey at

(Katz, Schmitt, 1940; Marrazzi, Lorente de No, 1944; 1970, 1973 ).

100 ( . 1) 13,43

±1,43%.

1. 2005 . %.

	655	216	88	351	61	290	-
%	100	32,98±1,84	13,43±1,43	53,59±1,95	9,31±1,13	44,28±1,94	-

: - ; -  
 ( ) ; -

2.

					t
	n	P±m %	n	P±m %	
1	37	5,65±0,90	88	13,43±1,43	4,6
					2,38

: t - 75  
 - 17  
 35 34  
 37-40  
 - 1 5  
 ( . 3)  
 (<0,001).  
 5,65 ± 0,90  
 % 13,43 ± 1,43, ( )  
 2,38 (2003).  
 12 37 8  
 ,14 38 8  
 1 39  
 - 13,43%, -28,4%, - 1-3  
 9,1%. 2. 12 38 , 14 39 , 8  
 40  
 2,4 : « »  
 , -  
 - 38 )  
 37 ( )  
 10,5±0,8  
 20,0±0,7  
 -  
 29,0±1,38  
 ;  
 : - - 15,8±0,8  
 ,