

**ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЮФО НА ЭТАПЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

Бобровский И.Н., Муравьева В.Н.,
Дементьева Д.М., Максименко Л.Л.
*ГОУ ВПО Ставропольская государственная
медицинская академия
Ставрополь, Россия*

Целью данного исследования стало комплексное изучение состояния здоровья лиц с наиболее распространенными и социально значимыми заболеваниями в периоды экономического кризиса и реформирования системы здравоохранения и научное, организационно-методологическое обоснование концепции по его укреплению, используя уникальные природно-климатические зоны национальной целостности. Работа выполнена на базе ГОУВПО СтГМА, с привлечением специалистов ЮФО. Материалами работы явились статистические данные, характеризующие показатели заболеваемости населения патологией, относящейся к группе социально значимых заболеваний в период с 1993 по 2008 гг. Ежегодно в ЮФО регистрируется более 30000 случаев социально значимых заболеваний. Исследование проводилось по генеральной совокупности, что обусловило репрезентативность данных, полученных в ходе исследования и достоверность выводов. Сведения о больших получены из первичных учетных форм. За изучаемый период показатель общей заболеваемости населения ЮФО по заболеваниям данной группы вырос в 7,89 раза, из них городского населения - в 12,53 раза ($p < 0,05$), сельского - в 4,76 раз ($p < 0,05$). Таким образом, эпидемическая ситуация в условиях города стала более напряженной. Для характеристики патоморфоза различных нозологий приведем некоторые, из полученных в ходе исследования, данные. Так, в 2000 году наивысший показатель заболеваемости по Южному Федеральному Округу был зарегистрирован в Ставропольском крае среди лиц в возрасте 20 - 29 лет, наименьший - на территории Краснодарского края среди лиц в возрасте старше 60 лет. В 2008 году пик заболеваемости, по-прежнему, приходился территориально на Ставропольский край в возрастной группе 20-29, а самый низкий показатель был зафиксирован в Ростовской области среди лиц в возрасте до 14 лет. При этом на всей территории ЮФО показатель заболеваемости лиц в возрасте старше 60 лет возрастал более высокими темпами - темп роста составил 86,2%. Более низкими были показатели заболеваемости социально значимыми заболеваниями среди других возрастных групп: 20-29 лет (68,7%); 40-49 лет (54,2%); 50-59 лет (39,3%); 30-39 лет (24,6%) и еще более медленными - среди возрастной группы 15-19 лет (7,4%). Общая динамика заболеваемости детей, по данной группе заболеваний, была более благоприятной. Так за 2008 год на территории ЮФО

заболеваемость среди детей снизилась на 12,9%. Социально значимыми заболеваниями чаще болели мужчины. На территории ЮФО в указанный для примера период исследования (в 2000 году) показатель заболеваемости мужчин был в 7,5 раза выше такового у женщин. Необходимо также отметить, что показатель заболеваемости женщин возрастал более медленными темпами (ежегодно в среднем на 5,7 %). Ежегодный темп роста показателя заболеваемости мужчин составил 14,7%. Всего с 2000 по 2006 гг. показатель заболеваемости женщин увеличился в 2,6 раза ($p < 0,05$), мужчин - в 4,7 раза ($p < 0,05$). Результаты проведенного анализа свидетельствуют о неблагоприятной ситуации по заболеваниям, относящимся к изучаемой группе заболеваний на территории ЮФО. Ретроградный анализ позволил выявить четкие гендерные различия между изучаемыми статистическими группами и обосновал необходимость развития инновационного подхода к изучаемому вопросу. При проведении данного исследования доказано: необходимость учета социально-эпидемиологических особенностей пациентов данной группы, что позволяет своевременно определять и прогнозировать тенденции развития и эпидемического процесса, а также разрабатывать комплекс мероприятий для ограничения распространения данных нозологий среди населения; необходимость и возможность повышения эффективности мероприятий по выявлению наиболее распространенных и социально значимых заболеваний среди населения при ограниченных материальных и кадровых ресурсах; обоснованность необходимости применения этапа восстановительного лечения у лиц с наиболее распространенными и социально значимыми заболеваниями, что позволит пересмотреть и доказать экономическую эффективность данного этапа лечения, а следовательно повлиять как на индивидуальное здоровье, так и общества в целом.

**ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ ЛИЦ С НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

Бобровский И.Н., Максименко Л.Л.,
Дементьева Д.М., Бобровский О.Н.
*ГОУ ВПО Ставропольская государственная
медицинская академия
Ставрополь, Россия*

До настоящего времени существовало большое количество систем и концепций по реализации различных адаптированных программ по оказанию помощи социально не защищенным категориям населения, но все они имели либо узкую направленность, либо низкую финансовую обеспеченность, что приводило в итоге к дисбалансу внутри выделенной социальной группы, в частности, и реорганизации всей «адаптирован-